

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 11-3-66

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE (Tél. 47-22-87)

(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

ABONNEMENT ANNUEL

15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.  
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

SUPPLEMENT N° I au BULLETIN N° 66 de MARS

Le 8 Mars 1966

## VIGNE

### Informations

#### Acariose de la vigne :

Les traitements de prédébourrement sont les plus efficaces contre ce parasite.

Une pulvérisation copieuse doit être réalisée :

- soit 20 jours avant le débourrement avec une bouillie à base d'huile d'anthracène.
- soit juste avant le débourrement (stade B. "bourgeons dans le coton") avec :
  - une bouillie sulfocalcique ou des soufres micronisés
  - un oléoparathion ou un oléomalathion

Ces derniers produits sont également actifs contre l'érinose.

## ARBRES FRUITIERS

### Avertissement

#### Tavelure du poirier :

La végétation de toutes les variétés s'échelonnant entre les stades D et E, des contaminations de tavelure sont à craindre dès la prochaine pluie. Un traitement doit être réalisé sur tous les poiriers aux stades précités.

#### Tavelure du pommier :

Dès la prochaine pluie des contaminations sont possibles sur toutes les variétés ayant atteint le stade C3 ; en effet le nombre d'ascospores capté en laboratoire augmente et le temps d'humidité nécessaire aux projections est relativement court. Un traitement est conseillé sur toutes les variétés ayant atteint ce stade.

## Informations

### Cecidomyies des poirettes :

Dans les vergers où les dégâts de cecidomyies ont été constatés l'an dernier un traitement est à effectuer à l'heure actuelle à l'aide d'insecticides tels que H.C.H. - D.D.T. - lindane ou ester phosphorique.

### Oïdium du pommier :

La lutte contre l'oïdium doit être entreprise de bonne heure sur toutes les variétés et particulièrement les plus sensibles. Le temps actuel est très propice à l'évolution de ce champignon. Il est recommandé dès maintenant d'intervenir soit à l'aide d'un fongicide spécifique dont certains ont une action préventive sur la tavelure soit à l'aide d'un mélange de spécialités.

Il est rappelé que des précautions sont à prendre quant à la compatibilité des produits entre eux.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytosanitaire de REIMS